

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Кухтенков П.А., Коваленко А.А., Брындина Т.В.

Целью настоящего исследования явилось изучение частоты и структуры послеоперационных гнойно воспалительных осложнений у больных пожилого и старческого возраста с острым холециститом .
Нами проанализировано 62 случая острого калькулёзного холецистита в возрастной группе пациентов старше 60 лет , оперированных на базе хирургических отделений Витебской областной клинической больницы за период с октября 2001 г по октябрь 2003 г.

Женщин из них было 44 , мужчин 18 .В предоперационном периоде все больные получали стандартную терапию , включающую спазмолитики , анальгетики инфузионную терапию . Всем пациентам вводились антибиотики . В подавляющем большинстве случаев наличие сопутствующихзаболеваний требовало медикаментозной коррекции состояния сердечно-сосудистой , дыхательной систем , уровня гликемии .

Всем больным выполнялась холецистэктомия , которая в 13 случаях дополнена холедохотомией с наружным дренированием холедоха , в 3 случаях накладывался холедоходуоденостомоз , ИХГ выполнялась 6 пациентам .

Послеоперационные гнойно-воспалительные осложнения наблюдались у 18 больных (29.03%) Структура их выглядит следующим образом :

- пневмония 7
 - подпеченочный абсцесс 4
 - холангит 4
 - воспалительные осложнения
 - со стороны послеоперационной раны 4
- Умерло 3 человека.

В послеоперационном периоде все больные получали антибиотики –применялась комбинация цефалоспоринов и аминогликозидов I – 3 поколений . Наличие осложнений существенно увеличивало сроки применения антибактериальных препаратов , а так же время пребывания в стационаре – с14.4 до 25.8 суток .

Таким образом, высокая частота послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений требует более детальной разработки комплекса лечебно-профилактических мероприятий у больных старшей возрастной группы с острым калькулезным холециститом.